

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36.01.74

N° ISSN 0756 640

DLP 27-6-84
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL : 115 F

Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.

PROTECTION DES VÉGÉTAUX

C. C. P. RENNES 9404-94 Y

BULLETIN "CULTURES MARAÎCHÈRES DE SERRE, CULTURES
LEGUMIÈRES DE PLEIN CHAMP ET POMMES DE TERRE, n° 97 -

20 JUIN 1984

POMMES DE TERRE : Mildiou en sourdine

JEUNES CHOUX ET CAROTTES : Attention aux insectes
SERRES

- . Pucerons et aleurodes : Ils se multiplient
- . Liriomyza trifolii : Une redoutable mineuse
- . Tomate : Cladosporiose toujours présente
- . Melon, concombre : Les acariens aiment la chaleur

POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DE CONSERVATION

MILDIOU -

Pas de contamination depuis le 11 juin.

Cependant, la météorologie nationale annonce le retour des pluies. Si cela se confirmait, traitez dès réception

de ce bulletin en associant si nécessaire un insecticide contre les larves de doryphores.

CONCOURS MILDIOU -

Vous pouvez encore gagner, tous les prix n'ont pas été attribués.

POMMES DE TERRE DE PRIMEUR

Les semences peuvent être traitées contre les pucerons à l'aide de Pirimor G à 500g/ha, Décis B ou Sumicidin 10 à 0,5 l/ha.

PEPINIÈRES DE CHOUX

La chaleur favorise l'activité des altises. En cas d'attaque, se reporter au bulletin précédent.

JEUNES CAROTTES

Attention aux pullulations de pucerons verts. Vous pouvez vous assurer de leur présence en plaçant des bacs jaunes entre les rangs. Les ailés viendront s'y noyer.

CULTURES DE SERRE

PUCERONS - ALEURODES -

Stoppez leur multiplication. Sinon vous risquez d'avoir de la fumagine.

LIRIOMYZA TRIFOLII -

Les larves de cette petite mouche attaquent de nombreuses plantes ornementales et maraîchères.

La lutte est très difficile. Aussi, dès l'apparition de galeries ou "mines", enlevez et brûlez les feuilles atteintes et prévenez le Service de la Protection des Végétaux ou un technicien des cultures maraîchères.

La fiche ci-jointe vous aidera à déceler les premiers dégâts.

TOMATE

CLADOSPORIOSE -

On observe de nouvelles sorties de taches. Aussi, dans les serres où cette maladie sévit, continuez à assurer la protection (cf bulletin du 24 mai). Aérez le plus largement possible pour provoquer des courants d'air.

MELON - CONCOMBRE

ACARIENS -

La chaleur actuelle favorise les pullulations. Utilisez l'un des produits donnés dans le bulletin du 8 juin. Alternez pour éviter les accoutumances.

DERNIERE NOTE : Bulletin n° 96 du 8 juin 1984




LIRIOMYZA TRIFOLII

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX



Adultes sur feuille d'aubergine (longueur : 1,4 à 2,3 mm)


Cliché Grisp Avignon



Détail d'une mine : asticot jaune dans sa galerie

Cliché Grisp Avignon

DÉGÂTS SUR TOMATE



Mines développées sur feuilles ; piqûres nutritionnelles et de ponte (points jaunes)

Cliché Grisp Avignon



Forte attaque

Cliché Grisp Avignon



Culture fortement attaquée

Cliché Grisp Avignon

DÉGÂTS SUR GERBERA



Mines sur feuilles : début d'attaque



Dégâts sur une culture